



Informacje o znieczuleniu

Znieczulenie (anestezja) jest to wprowadzenie chorego w stan umożliwiający wykonanie operacji. Znieczulenie bywa dzielone na znieczulenie ogólne (dotchawicze i dożylne) oraz znieczulenie przewodowe.

Do wykonywania zabiegów na przewodzie pokarmowym stosowane jest znieczulenie ogólne.

Znieczulenie ogólne charakteryzuje odwracalne spowodowanie snu, brak odczuwania bólu i zwiotczenie mięśni. Są to tzw. cechy znieczulenie ogólnego, które ustępują po podaniu specyficznych preparatów medycznych.

Znieczulenie ogólne, krótkotrwałe dożylne – to taki rodzaj znieczulenia w którym choremu podawany jest lek przeciwbólowy i dożylny środek znieczulający. Sen następuje po około 30-50 sekundach. Chory w czasie znieczulenia oddycha sam. Po pojedynczej dawce środka znieczulającego śpi około 5-7 minut, dawkę leku można powtarzać. Znieczulenie krótkotrwałe dożylne umożliwia wykonanie procedur chirurgicznych trwających nie dłużej niż kilka do kilkunastu minut.

Znieczulenie ogólne dotchawicze – polega na podawaniu leków przeciwbólowych, nasennych i środków zwiotczających mięśnie. Do prowadzenia wentylacji płuc(oddychania) konieczne jest wprowadzenie specjalnej rurki do tchawicy (wykonanie intubacji) i połączenie jej z respiratorem aparatu do znieczulania. Aby utrzymać znieczulenie należy podawać okresowo leki przeciwbólowe i środki zwiotczające mięśnie. Czynności te powodują , że spełnione zostają kryteria znieczulenia czyli pacjent śpi, nie odczuwa bólu i ma zwiotczone mięśnie.

Nie ma uniwersalnego rodzaju znieczulenia. Każdy z Państwa jest traktowany indywidualnie. Lekarz anestezjolog dla każdego pacjenta wybiera poszczególne środki znieczulające w taki sposób, aby nie zaburzyć lub zaburzyć w niewielkim stopniu ogólny stan zdrowia chorego. Na pewno zaproponuje Państwu najlepszy rodzaj znieczulenia.

Bezpieczeństwo pacjenta zależy od:

- stanu fizycznego,
- schorzenia podstawowego i choroby współistniejącej oraz jej kontroli w okresie przedoperacyjnym, np. przyjmowania leków z powodu nadciśnienia tętniczego,
- kompetencji zespołu znieczulającego i operacyjnego,
- sprzętu służącego do wykonania znieczulenia i operacji
- występujących w czasie operacji powikłań
- posiadanych leków oraz środków w tym krwi i jej składników,
- informacji wynikających z konsultacji i badań dodatkowych

- 1 -



W celu zapewnienia Państwo bezpiecznego znieczulenia:

- każdy pacjent kwalifikowany do zabiegu powinien mieć oznaczoną grupę krwi,
- kobiety w wieku rozrodczym powinny mieć wykonany test ciążowy,
- pacjenci, których stan zdrowia jest oceniany jako I i II stopień w skali ASA , kwalifikowani do drobnych zabiegów w znieczuleniu ogólnym, których czas nie przekracza 30min. mniej wymagają wykonania badań dodatkowych,
- kobiety >40roku życia, których stan zdrowia jest oceniany jako I i II stopień w skali ASA , kwalifikowani do drobnych zabiegów w znieczuleniu ogólnym, których czas nie przekracza 30min powinny mieć wykonane podstawowe badanie morfologiczne krwi
- mężczyznom po 39 roku życia i kobietom po 49 roku życia należy wykonać badanie EKG, o ile nie miały wykonanego badania w okresie ostatnich 2 miesięcy,
- pacjentom ocenianym jako III stopień w skali ASA zakres badań dodatkowych przed znieczuleniem określi specjalista anestezjolog.

Ponieważ zabieg będzie wykonywany na przewodzie pokarmowym, należy powstrzymać się od spożywania pokarmów stałych i przyjmowania płynów na 6 godzin przed planowanym znieczuleniem.

Pamiętaj, że przed każdym leczeniem zabiegowym należy:

- podzielić się swoimi wątpliwościami i dolegliwościami z lekarzem,
- zadawać pytania, ponieważ nigdy nie są one głupie a odpowiedzi dla lekarza oczywiste dla pacjenta mogą stanowić poważną zagadkę,
- dostosować się do wszystkich zaleceń wydanych przez lekarza dotyczących okresu przed, w trakcie i po znieczuleniu,
- zgłaszać niezwłocznie lekarzowi wszelkie zmiany w swoim stanie zdrowia, informować o nudnościach i wymiotach.

Pamiętaj!

- w ciągu 24 godzin po znieczuleniu nie należy prowadzić samochodu i obsługiwać skomplikowanych urządzeń.
- nie podejmować żadnych ważnych dla Państwa decyzji, nie podpisywać żadnych dokumentów w dniu zabiegu.
- nie opuszczać szpitala jeżeli w drodze do domu i w domu nie będzie mogła towarzyszyć nam bliska osoba.
- nie spożywać przez co najmniej 24 godzin po znieczuleniu alkoholu.
- zapewnić sobie kilkudniowy odpoczynek i spożywać lekkostrawne posiłki.