



## Znieczulenie dożylnie do zabiegów endoskopowych

### Informacje ogólne

Znieczulenie dożylnie polega na podawaniu leków przeciwlękowych, przeciwbólowych i nasennych drogą dożylną. Podczas tego rodzaju znieczulenia pacjent nie odczuwa bólu, a świadomość jest okresowo ograniczona lub całkowicie wyłączona. Znieczulenie ma na celu wyłączenie bólu i leku oraz zmniejszenie dyskomfortu związanego z zabiegiem. Podczas znieczulenia pacjent jest pod stałym nadzorem lekarza anestezjologa i pielęgniarki anestezjologicznej, a jego funkcje życiowe czyli praca serca, oddech, ciśnienie tętnicze i natlenienie krwi są stale monitorowane. Wszystkim pacjentom podawany jest tlen. Po zabiegu pacjent jest przewożony do sali obserwacyjnej, w której pozostaje do momentu, gdy jego stan ogólny umożliwi opuszczenie placówki w towarzystwie drugiej osoby, dorosłej i godnej zaufania.

### Aby zabieg endoskopowy mógł odbyć się w znieczuleniu należy spełnić poniższe warunki:

- Pacjent na zabieg zgłasza się na czczo tzn. minimum 6 godzin bez jedzenia i picia
- W przypadku leczenia chorób serca lub nadciśnienia tętniczego należy przyjąć dawkę poranną leków
- W przypadku cukrzycy nie należy przyjmować leków doustnych przeciwcukrzycowych oraz insuliny (po konsultacji z lekarzem prowadzącym).
- W przypadku przygotowywania się do badania jelita grubego preparatem (FORTRANS, Fleet- Phospho-soda, Olopeg) nie należy przyjmować ich w dniu badania gdy może to grozić poważnymi konsekwencjami w przypadku zachłyśnięcia.
- W przypadku osób przyjmujących leki obniżające krzepliwość krwi (np. acenocumarol, sintrom, ticlid lub aspiryna, acard, acesan i inne) na 7 dni przed badaniem należy przerwać ich stosowanie, co wcześniej powinno być skonsultowane z lekarzem prowadzącym. Może być też konieczna zamiana tych leków na heparyny niskocząsteczkowe (np. Fraxiparyna, Clexane). Informacja o kontynuacji leczenia przeciwkrzepliwego po zabiegu będzie zawarta w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego.
- W dniu badania należy zgłosić się bez makijażu i pomalowanych paznokci u rak (utrudnia to prawidłowe monitorowanie pacjenta), a biżuterię i inne cenne przedmioty prosimy pozostawić w domu.

### Możliwe powikłania:

Znieczulenie, jak każde działanie lekarskie, obarczone jest pewnym ryzykiem powikłań. Prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań groźnych dla życia jest znikome, zależy przede wszystkim od stanu ogólnego pacjenta i rodzaju wykonywanego zabiegu endoskopowego. Do najczęstszych powikłań należą: reakcja alergiczna na leki, zaburzenia czynności układu oddechowego i krążenia. Zespół anestezjologiczny jest przygotowany do natychmiastowego skutecznego leczenia tych powikłań.

### Oświadczenie:

Zapoznałem/zapoznałam się z powyższą informacją i przyjąłem/przyjęłam do wiadomości.

Zamość, dnia .....

podpis Pacjenta/opiekuna prawnego .....

podpis/pieczętka lekarza .....