



## Znieczulenie ogólne do zabiegów endoskopowych

### Informacje ogólne

Znieczulenie ogólne polega na wprowadzeniu pacjenta w stan podobny do bardzo głębokiego snu. W czasie takiego znieczulenia świadomość pacjenta jest wyłączona, nie odczuwa on bólu oraz nic nie słyszy. W trakcie znieczulenia ogólnego pacjent oddycha przy pomocy respiratora mieszanina tlenu i gazów usypiających. Przez cały czas pozostaje pod opieką lekarza anestezjologa i pielęgniarki anestezjologicznej, którzy kontrolują funkcje życiowe pacjenta (czynność serca, ciśnienie tętnicze, oddech, stopień natlenienia krwi). Po zabiegu pacjent jest przewożony do sali obserwacyjnej, w której przebywa do czasu pełnego odzyskania świadomości (ok. 1,5 – 2 godziny), następnie przewożony jest do oddziału w którym pozostaje do rana.

### Aby zabieg endoskopowy mógł odbyć się w znieczuleniu należy spełnić poniższe warunki:

- Pacjent na zabieg zgłasza się na czczo tzn. minimum 6 godzin bez jedzenia i picia
- W przypadku leczenia chorób serca lub nadciśnienia tętniczego należy przyjąć dawkę poranną leków
- W przypadku cukrzycy nie należy przyjmować leków doustnych przeciwcukrzycowych oraz insuliny (po konsultacji z lekarzem prowadzącym).
- W przypadku osób przyjmujących leki obniżające krzepliwość krwi (np. acenocumarol, sintrom, ticlid lub aspiryna, acard, acesan i inne) na 7 dni przed badaniem należy przerwać ich stosowanie, co wcześniej powinno być skonsultowane z lekarzem prowadzącym. Może być też konieczna zamiana tych leków na heparyny niskocząsteczkowe (np. Fraxiparyna, Clexane). Informacja o kontynuacji leczenia przeciwkrzepliwego po zabiegu będzie zawarta w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego.
- W dniu badania należy zgłosić się bez makijażu i pomalowanych paznokci u rak (utrudnia to prawidłowe monitorowanie pacjenta), a biżuterie i inne cenne przedmioty prosimy pozostawić w domu.

### Możliwe powikłania:

Znieczulenie, jak każde działanie lekarskie, obarczone jest pewnym ryzykiem powikłań. Prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań groźnych dla życia jest znikome, zależy przede wszystkim od stanu ogólnego pacjenta i rodzaju wykonywanego zabiegu endoskopowego. Do najczęstszych powikłań należą: reakcja alergiczna na leki, zaburzenia czynności układu oddechowego i krążenia. Zespół anestezjologiczny jest przygotowany do natychmiastowego skutecznego leczenia tych powikłań.

### Oświadczenie:

Zapoznałem/zapoznałam się z powyższą informacją i przyjąłem/przyjęłam do wiadomości.

Zamość, dnia .....

podpis Pacjenta/opiekuna prawnego .....

podpis/pieczętka lekarza .....